

Technische Information

Fungizid gegen Falschen Mehltau in Weinreben



Nr. 006260-00

Nicht Bienengefährlich (B4)

Wirkungsweise

Fantic F ist eine ideale Kombination des systemischen Wirkstoffes Benalaxyl-M und von Folpet mit oberflächenaktiver Wirkung. Benalaxyl-M dringt schnell in alle grünen Pflanzenteile ein und verteilt sich mit dem Saftstrom in der gesamten Pflanze. Folpet bildet auf der Oberfläche der Reben ein sporizides Wirkstoffdepot, das die Sporenkeimung zuverlässig verhindert. Verwenden Sie Fantic F vorbeugend in einer Spritzfolge. Die erste Anwendung sollte bei hohem Infektionsdruck zur Vorblüte bis Blühbeginn (BBCH 61) erfolgen. Beachten Sie dazu auch Prognosehilfen wie vitimeteo.de
Eine Anwendung mit FANTIC F soll auf jedem Fall vor Traubenschluss (spätestens BBCH 75) erfolgen.

Diese Technische Information informiert über die Anwendungsmöglichkeiten. Sie ersetzt nicht das Lesen der ausführlichen Gebrauchsanleitung.

Stand: 13.10.2017

Neben dem guten Schutz vor Peronospora nutzen Sie auch die vorbeugende Wirkung gegen Botrytis aus.

Wirkungsmechanismen (FRAC-Klasse): Benalaxyl-M: 4; Folpet: M4

Anwendung

Gegen Falschen Mehltau:

Basisaufwand: 0,6 kg/ha

max. 400 l/ha Wasser

Ab Rebstadium ES 61: 1,2 kg/ha in

max. 800 l/ha Wasser

Ab Rebstadium ES 71: 1,8 kg/ha in

max. 1200 l/ha Wasser

Ab Rebstadium ES 75: 2,4 kg/ha in

max. 1600 l/ha Wasser

Volumendosierung: 1 kg Fantic F

entsprechen ca. 1,5 Liter

Anwendungszeitpunkt

Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warn-diensthinweis. Max. 3 Anwendun-

Formulierung:

Wasserdispergierbares Granulat

Wirkstoffe:

480 g/kg (48,0 Gew.-%) Folpet ,

37,5 g/kg (3,75 Gew.-%) Benalaxyl-M

Abpackung

5 kg Sack

Orig.Kart.(4 x 5 kg)

Art.Nr.70009

Einstufung (Gef-StoffV/TRGS510/ADR)

Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt

gen in der Kultur bzw. pro Jahr im Abstand von 10 - 14 Tagen.

Bitte beachten

Gewässerabstandsauflage NW607-reduzierte Abstände: 90%, 20 m
NW607- Schutz vor Abschwemmung: bewachsener Randstreifen 20 m

Ihre wichtigsten Vorteile

- Sichere Wirkung gegen Peronospora
- Phomopsis, Roter Brenner werden ebenfalls erfasst
- Nebenwirkung gegen Botrytis
- Vollsystemisch wirksam, schützt die gesamte Pflanze.
- Nach kurzer Zeit regenfest: Sicherheit auch bei Niederschlägen
- Folpet mit Multi-site Wirkungsprinzip gegen Resistenzbildung

SUMI AGRO LIMITED

Bürgermeister-Neumeyr-Straße 7

85391 Allershausen

Tel. 08166 99823 -00

Fax. 08166 99823-20

e-mail: sumiagro@sumiagro.com